

Vous travaillez en cabinet libéral ou en HDJ
auprès de patients aphasiques post AVC ?

Participez à la validation de la version française du SADQ-A10 et améliorez le dépistage de la dépression post AVC



Pourquoi s'intéresser à ce sujet ?

60% des sujets aphasiques présentent une dépression l'année qui suit leur AVC, ce qui peut affecter leur prise en charge. Ces patients ne sont pas suffisamment dépistés, souvent du fait de leurs difficultés langagières.



Le SADQ-A10 : késako ?

Il s'agit d'un questionnaire anglo-saxon de dépistage de la dépression chez des patients aphasiques post AVC qui est simple et rapide d'utilisation. Il doit être rempli sur la base de vos observations, sans la participation du patient.



Notre objectif est de valider la version française de ce questionnaire et de le mettre à disposition des orthophonistes français(e)s.

Qui cherchons-nous ?

Des orthophonistes exerçant en cabinet libéral ou HDJ, auprès de patients :

- aphasiques post AVC
- âgés de plus de 18 ans,
- en phase subaiguë ou chronique,
- de retour à leur domicile depuis au moins 14 jours.

Comment nous aider ?

En complétant :

- 1 fiche d'informations concernant le patient (5 minutes)
- 3 questionnaires basés sur vos observations (15 minutes en tout)
- en option, vous pouvez proposer à un proche du patient de remplir le SADQ-10 de manière indépendante (pour tester la fidélité inter-juges).

Intéressé(e) ?

Cliquez sur le lien en description

guillemette.montignon1@etu.upmc.fr ; audrey.pavard1@etu.upmc.fr (CFO Paris)
sous la direction de N. Joyeux (orthophoniste)

